

HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Conduta Ativa do Terceiro Período

- 10UI Ocitocina, logo após o nascimento
- Clampeamento Tardio de Cordão (1 a 3 min, ou até cessarem os batimentos)
- Tração controlada de cordão

Perda de Sangue > 500 mL

↓PA ↑ FC e/ou sinais e sintomas

Ressuscitação

- 2 acessos venosos calibrosos
- Colher HMG/ ABO RH/ TS /Prova Cruzada/ Tubo seco
- O2
- Monitorar PA FC Débito Urinário

Determinar a causa: 4 Ts

SINAIS CLÍNICOS, GRAU DO CHOQUE HIPOVOLÊMICO E O ÍNDICE DE CHOQUE

Perda de Sangue (mL)	Frequência Cardíaca (bpm)	Pressão Sistólica (mmHg)	Índice de Choque (FC/PS)	Grau de Choque
10-15% 500-1000 mL	60-90	>90	0,7-0,9	Compensado
10-15% 500-1000 mL	91 - 100	80-90	0,9-1,3	Leve
10-15 % 500-1000 mL	101-120	70-79	0,3-1,7	Moderado
10-15% 500-1000 mL	>120	<70	>1,7	Grave

HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Conduta Ativa do Terceiro Período

- 10UI Ocitocina, logo após o nascimento
- Clampeamento Tardio de Cordão (1 a 3 min, ou até cessarem os batimentos)
- Tração controlada de cordão

Perda de Sangue > 500 mL

↓PA ↑ FC e/ou sinais e sintomas

Ressuscitação

- 2 acessos venosos calibrosos
- Colher HMG/ ABO RH/ TS /Prova Cruzada/ Tubo seco
- O2
- Monitorar PA FC Débito Urinário

Determinar a causa: 4 Ts

SINAIS CLÍNICOS, GRAU DO CHOQUE HIPOVOLÊMICO E O ÍNDICE DE CHOQUE

Perda de Sangue (mL)	Frequência Cardíaca (bpm)	Pressão Sistólica (mmHg)	Índice de Choque (FC/PS)	Grau de Choque
10-15% 500-1000 mL	60-90	>90	0,7-0,9	Compensado
10-15% 500-1000 mL	91 - 100	80-90	0,9-1,3	Leve
10-15 % 500-1000 mL	101-120	70-79	0,3-1,7	Moderado
10-15% 500-1000 mL	>120	<70	>1,7	Grave

HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Conduta Ativa do Terceiro Período

- 10UI Ocitocina, logo após o nascimento
- Clampeamento Tardio de Cordão (1 a 3 min, ou até cessarem os batimentos)
- Tração controlada de cordão

Perda de Sangue > 500 mL

↓PA ↑ FC e/ou sinais e sintomas

Ressuscitação

- 2 acessos venosos calibrosos
- Colher HMG/ ABO RH/ TS /Prova Cruzada/ Tubo seco
- O2
- Monitorar PA FC Débito Urinário

Determinar a causa: 4 Ts

SINAIS CLÍNICOS, GRAU DO CHOQUE HIPOVOLÊMICO E O ÍNDICE DE CHOQUE

Perda de Sangue (mL)	Frequência Cardíaca (bpm)	Pressão Sistólica (mmHg)	Índice de Choque (FC/PS)	Grau de Choque
10-15% 500-1000 mL	60-90	>90	0,7-0,9	Compensado
10-15% 500-1000 mL	91 - 100	80-90	0,9-1,3	Leve
10-15 % 500-1000 mL	101-120	70-79	0,3-1,7	Moderado
10-15% 500-1000 mL	>120	<70	>1,7	Grave

HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Conduta Ativa do Terceiro Período

- 10UI Ocitocina, logo após o nascimento
- Clampeamento Tardio de Cordão (1 a 3 min, ou até cessarem os batimentos)
- Tração controlada de cordão

Perda de Sangue > 500 mL

↓PA ↑ FC e/ou sinais e sintomas

Ressuscitação

- 2 acessos venosos calibrosos
- Colher HMG/ ABO RH/ TS /Prova Cruzada/ Tubo seco
- O2
- Monitorar PA FC Débito Urinário

Determinar a causa: 4 Ts

SINAIS CLÍNICOS, GRAU DO CHOQUE HIPOVOLÊMICO E O ÍNDICE DE CHOQUE

Perda de Sangue (mL)	Frequência Cardíaca (bpm)	Pressão Sistólica (mmHg)	Índice de Choque (FC/PS)	Grau de Choque
10-15% 500-1000 mL	60-90	>90	0,7-0,9	Compensado
10-15% 500-1000 mL	91 - 100	80-90	0,9-1,3	Leve
10-15 % 500-1000 mL	101-120	70-79	0,3-1,7	Moderado
10-15% 500-1000 mL	>120	<70	>1,7	Grave